SALUD pública
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Artículo original AO

Estudios exclusivos e inéditos, seleccionados con rigurosidad científica y revisados por pares

BECA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA "JULIETA LANTERI" 2024-2025

Salud Publica 2026 Oct; 5

Las tareas de cuidado y la exposición diferencial al dengue desde una perspectiva de género: un estudio en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina (2024–2025)

Caregiving tasks and differential exposure to dengue from a gender perspective: a study in La Plata, Buenos Aires Province, Argentina (2024–2025)

Au

Melina Victoria Brividoro **1**	Doctora en Ciencias Naturales	https://orcid.org/0000-0002-6710-618X
María Eugenia Cano **1**	Doctora en Ciencias Naturales	https://orcid.org/0000-0002-6101-2246
María Victoria Micieli **1**	Doctora en Ciencias Naturales	https://orcid.org/0000-0003-0616-2214
Lucía Tack **2**	Licenciada en Psicología	
María Eugenia Lasarte **2**	Licenciada en Trabajo Social	

1 Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina
2 Servicio de Área Programática y Redes en Salud, Hospital Interzonal General de Agudos San Roque de Gonnet, Argentina

melina_brividoro@hotmail.com

Rs

RESUMEN

Introducción: El dengue es una enfermedad modelada por factores sociales, ambientales, ecológicos y climáticos. La incorporación de dimensiones sociales con perspectiva de género, como la división sexual del trabajo, resulta relevante para comprender las condiciones que configuran la exposición a enfermedades transmitidas por vectores. **Objetivo:** Caracterizar las condiciones de exposición al dengue asociadas a la división sexual del trabajo reproductivo, integrando información sociocultural y entomológica para comprender cómo las desigualdades de género configuran patrones diferenciales de exposición en relación con el tiempo de permanencia en ámbitos domiciliarios. **Métodos:** Se realizó un estudio observacional descriptivo en el área programática del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) San Roque de Gonnet (La Plata, Buenos Aires). Se aplicaron 43 Encuestas de Uso del Tiempo (EUT) a mujeres adultas, quienes aportaron información sobre las personas que integran su hogar y cómo es la distribución del trabajo reproductivo y productivo. Se realizaron relevamientos entomológicos mediante la instalación de 20 ovitrampas y colectas de mosquitos. Se analizaron variables climáticas para caracterizar el contexto ambiental durante el período de estudio. **Resultados:** Las encuestas permitieron relevar información correspondiente a más de 130 personas. Los hallazgos revelan una disparidad significativa en las responsabilidades de cuidado: tanto en términos del número de mujeres como del total de horas, las mujeres realizaron sistemáticamente más tareas de cuidado que los hombres en ambientes propicios para la existencia del mosquito. El trabajo remunerado realizado por las mujeres incluye tareas de cuidado realizadas en espacios relevantes para la exposición ante el vector *Aedes aegypti*. Los relevamientos entomológicos permitieron registrar la presencia de *Aedes aegypti*, Culex sp. y *Aedes albifasciatus*, y evidenciaron variaciones en la abundancia de huevos asociadas a variables climáticas como temperatura y precipitaciones. **Conclusiones:** Los resultados resaltan la importancia de incorporar la perspectiva de género en el análisis epidemiológico del dengue, considerando la división sexual del trabajo reproductivo como una dimensión social relevante dentro de los determinantes de la salud. La integración de información social, entomológica y ambiental, constituye una aproximación metodológica útil para comprender las condiciones que intervienen en la exposición a enfermedades transmitidas por vectores.

Palabras clave: Dengue; Perspectiva de Género; Epidemiología

Ab

ABSTRACT

Introduction: Dengue is a disease shaped by social, environmental, ecological, and climatic factors. Incorporating social dimensions from a gender perspective, such as the sexual division of labor, is relevant for understanding the conditions that shape exposure to vector-borne diseases. **Objective:** To characterize the conditions of exposure to dengue associated with the sexual division of reproductive labor by integrating sociocultural and entomological information in order to understand how gender inequalities shape differential patterns of exposure related to the time spent in household environments. **Methods:** A descriptive observational study was conducted in the programmatic area of the San Roque General Acute Care Hospital (HIGA) in Gonnet, La Plata, Buenos Aires, Argentina. Forty-three Time Use Surveys (TUS) were administered to adult women, who provided information about the members of their households and the distribution of reproductive and productive work among them. Entomological surveys were conducted using 20 ovitraps and mosquito collections. Climatic variables were analyzed to characterize the environmental context during the study period. **Results:** The surveys provided information on more than 130 individuals. The findings reveal a significant disparity in caregiving responsibilities: both in terms of the number of women and the total number of hours devoted to these activities, women consistently performed more caregiving tasks than men, and these activities took place in environments favorable to the presence of the mosquito. Women's paid work also included caregiving activities carried out in settings relevant to exposure to the vector *Aedes aegypti*. Entomological surveys recorded the presence of *Aedes aegypti*, Culex sp., and *Aedes albifasciatus*, and showed variations in egg abundance associated with climatic variables such as temperature and precipitation. **Conclusions:** The findings highlight the importance of incorporating a gender perspective into the epidemiological analysis of dengue by considering the sexual division of reproductive labor as a relevant social dimension among the determinants of health. The integration of social, entomological, and environmental information provides a useful methodological approach for understanding the conditions that shape exposure to vector-borne diseases.

Keywords: Dengue; Gender Perspective; Epidemiology

Recibido: 18 de marzo 2026 **Aceptado:** 31 de marzo 2026. **Aprobado:** 15 de junio 2026. **Publicado:** 30 de octubre 2026.

Salud Publica 2026 Oct; 5

In
INTRODUCCIÓN

La medicina social propone repensar la concepción tradicional del proceso salud-enfermedad-atención-cuidados y ofrece un abordaje de las problemáticas relacionadas con la salud desde una perspectiva intersectorial que considere el entramado social multidimensional en el que están inmersos y del cual forman parte (1-2). Una de las áreas sanitarias donde el efecto de los indicadores socioculturales posee un efecto de gran impacto es la epidemiología de enfermedades transmitidas por vectores (ETV) (3-4). Desde esta mirada, las desigualdades e inequidades determinadas por el género, muchas veces en intersección con otras categorías de análisis implicadas en aspectos sociales, culturales y económicos, operan para obstaculizar el acceso y el ejercicio de los derechos por parte de las mujeres (5-6). Estas situaciones de desventaja pueden analizarse desde diversos abordajes, como por ejemplo desde una perspectiva sanitaria (5).

La división sexual del trabajo es el resultado del recorrido histórico y cultural de una sociedad que tiene como desenlace la repartición desigual de oportunidades entre varones y mujeres, situando a las mujeres en una posición de subordinación con relación con los varones, ya que las tareas que normalmente se les adjudican a las mujeres, son menos valoradas y peor remuneradas que aquellas que desarrollan típicamente los varones (7). El trabajo productivo es realizado principalmente por varones y es aquel que está íntimamente relacionado con la producción de bienes y servicios (7). Por otro lado, el trabajo reproductivo (tareas domésticas y/o de cuidado), que es realizado principalmente por mujeres, se desarrolla en el ámbito privado (dentro de los hogares u otros ámbitos domésticos) y se basa en el cuidado y sostenimiento del bienestar de personas que necesitan ser cuidadas (3-4, 7-9). El hecho de que las mujeres dediquen más del doble de horas por días a la realización de tareas domésticas las coloca en una situación de desventaja con respecto a los varones, que afecta a todos los aspectos de su vida individual y social, pública y privada (3, 7, 10). Todas las categorías que interseccionan para perpetuar, reproducir y amplificar estas desigualdades, deben ser consideradas a la hora de la construcción, planificación y gestión de políticas públicas, en este caso, de carácter sanitario.

Particularmente, este trabajo de investigación propone analizar cómo la división sexual del trabajo configura condiciones diferenciales de exposición y vulnerabilidad al contagio de dengue, considerando la interacción con otros determinantes sociales y ambientales que intervienen en la transmisión de las ETV. A partir de los antecedentes de diferentes países de América Latina, donde se da cuenta del riesgo diferencial de contagio de ETV de acuerdo con el género, y reconociéndolo como un determinante social que configura condiciones diferenciales de exposición y vulnerabilidad y limita su acceso al derecho a la salud, se propone un abordaje novedoso desde una epidemiología con perspectiva de género (3, 5, 11-12). Diversos estudios proponen incorporar una mirada interdisciplinaria e intersectorial para el abordaje de las ETV (2-3, 5,11-13).

La realización de tareas en el ámbito privado constituye una dimensión de interés para la epidemiología social, ya que numerosos artrópodos hematófagos de importancia sanitaria presentan hábitos domiciliarios y peridomiciliarios (12, 14). En este sentido, el tiempo de permanencia en estos espacios puede considerarse una condición que incrementa las oportunidades de exposición a las picaduras de los vectores. A su vez, esta exposición se ve aumentada si esas personas no tienen acceso a una vivienda digna, no poseen infraestructura mínima que asegure la higiene del espacio (falta de suministro de agua, etc.), no pueden acceder a educación, entre otros (12).

Los agentes etiológicos del dengue, zika y otros patógenos son transmitidos por vectores hematófagos que habitan los hogares de las personas de las cuales se alimentan y pasan a formar parte de los ciclos urbanos (14-15). El virus del dengue posee como vector principal en el ciclo urbano al mosquito *Aedes (Stegomyia) aegypti* y como vector secundario *Aedes albopictus* (14). Particularmente, la especie *Ae. aegypti* tiene hábitos domiciliarios y peridomiciliarios, y preferencia por oviponer en recipientes artificiales que contienen agua. Las hembras tienen hábitos antropofílicos y presentan características adaptativas frente a condiciones ambientales adversas (16-19). Su densidad poblacional está determinada además por factores climáticos como la temperatura, la humedad y las precipitaciones (12, 20). Cabe destacar que *Ae. aegypti* es vector del dengue y de otros arbovirus de importancia sanitaria, por lo que la presencia del mosquito podría indicar o propiciar la circulación de otros arbovirus, además del dengue (14). La presencia y supervivencia de esta especie de mosquito está íntimamente relacionada con la urbanización, específicamente aquella que se desarrolla de manera no planificada y que da lugar a sitios de cría (3, 5, 12).

A partir de esto, se formularon hipótesis y objetivos en distintos niveles analíticos, considerando los diferentes escenarios que configuran la vulnerabilidad frente a la transmisión de ETV desde una perspectiva de género.

[1] Artrópodo hematófago: artrópodo que obtiene su alimento mediante la ingesta de sangre de vertebrados, ya sea de forma obligada o durante una fase específica de su ciclo de vida.

Hipótesis

La división sexual del trabajo reproductivo configura patrones diferenciales de permanencia y actividad en ámbitos domiciliarios y peridomiciliarios, generando condiciones diferenciales de exposición al *Aedes aegypti.* En este contexto, las mujeres que asumen una mayor carga de tareas de cuidado presentan una mayor permanencia en espacios donde puede producirse el contacto con el vector.

Objetivo general

Caracterizar las condiciones de exposición al dengue asociadas a la división sexual del trabajo reproductivo, integrando información sociocultural y entomológica para comprender cómo las desigualdades de género configuran patrones diferenciales de exposición en relación con el tiempo de permanencia en ámbitos domiciliarios.

Objetivos específicos

1) Caracterizar la distribución del tiempo destinado al trabajo reproductivo, a fin de identificar diferencias asociadas a la división sexual del trabajo que contribuyen a configurar condiciones diferenciales de exposición al dengue.

2) Describir las condiciones sociales, habitacionales y ambientales de los espacios donde las mujeres desarrollan el trabajo reproductivo y productivo, identificando características del entorno que podrían favorecer la presencia de *Aedes aegypti*.

Mt y Md

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio se desarrolló de manera colaborativa entre dos instituciones, el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE)-CONICET-UNLP-Asociado a CIC y el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) San Roque de Gonnet, La Plata, Buenos Aires, Argentina.

Se llevó a cabo durante agosto de 2024 a junio de 2025 en el área programática del hospital que se ubica dentro de la Región Sanitaria XI de la provincia de Buenos Aires. El municipio de La Plata ha presentado desde agosto de 2023 a abril del 2024 el mayor número de casos positivos de la región (21).

Tipo de estudio y diseño

Estudio prospectivo observacional longitudinal. Se empleó un muestreo no probabilístico de tipo intencional. La población de estudio estuvo constituida por mujeres mayores de 18 años que residen en el sitio de estudio. Las participantes fueron incorporadas de manera voluntaria en distintos espacios comunitarios como postas de salud, centros de salud, instituciones barriales, entre otros. Las mujeres encuestadas aportaban toda la información que se requería en la encuesta tanto de ellas como de las otras personas que integraban sus hogares, incluida la información relacionada con la distribución del tiempo destinado al trabajo reproductivo y productivo.

Relevamiento de determinantes socioeconómicos

Se realizaron Encuestas sobre el Uso del Tiempo (EUT) anonimizadas con enfoque de género a mujeres que habitan el área programática del HIGA San Roque de Gonnet. Este tipo de encuestas permite cuantificar la duración de una determinada actividad realizada (22), a la vez que permite obtener información sobre diferentes variables de la población (género, edad, etc.) y diferentes factores sociales, económicos y ambientales, características de la población que podrían estar relacionadas con la gestión del tiempo (10, 23-24). Para el diseño de las encuestas se siguieron las recomendaciones metodológicas propuestas para las EUT con perspectiva de género (23,25) y se realizaron adaptaciones particulares para cubrir los requerimientos de este proyecto (apartados relacionados con antecedentes de dengue, condiciones de la vivienda, urbanización de la zona, elementos de prevención del dengue). La encuesta se aplicó a mujeres mayores de 18 años que respondieron aportando sus propios datos y los de su grupo familiar. Las planillas se completaban mientras se realizaba la encuesta, a medida que se avanzaba por los distintos apartados y se explicaban los ítems a completar.

Relevamiento entomológico

Se colocaron 20 ovitrampas en hogares y establecimientos de salud (Centros de Atención Primaria de la Salud -CAPS- e HIGA San Roque) ubicados en el área de estudio durante las semanas epidemiológicas (SE) 35-52 de 2024 y 1-22 de 2025, con el objetivo de relevar la presencia de *Aedes aegypti* y estimar indirectamente su abundancia a partir del número de huevos recolectados. La instalación de las ovitrampas en los establecimientos de salud se realizó con el aval de las autoridades responsables de las instituciones, mientras que en los hogares se efectuó con la aceptación voluntaria de las personas. Las ovitrampas consistían en recipientes plásticos

pintados de negro de aproximadamente 500 ml a los que se les realizaron perforaciones a 5 cm por debajo del borde superior para evitar que rebalsen con el agua de lluvia. Los recipientes se llenaban con agua hasta aproximadamente dos tercios de su capacidad y luego se introducía una paleta de madera como sustrato de oviposición, la cual era reemplazada semanalmente (26). Las paletas retiradas se secaban, se almacenaban en bolsas rotuladas y se trasladaban hasta el CEPAVE donde se procedía a su observación e identificación de los huevos bajo lupa estereoscópica (Figura 1).

La ubicación geográfica de las ovitrampas y de las cuadras en las que se ubicaban los hogares de las personas encuestadas fue registrada mediante georreferenciación y representada cartográficamente, con el objetivo de visualizar su distribución espacial dentro del área de estudio. Esta información fue utilizada con fines descriptivos y no implicó un análisis espacial de asociación entre la distribución de las variables sociales y entomológicas.



Figura 1. a) Paleta con huevos de *Aedes aegypti*; **b)** paletas para observar bajo lupa estereoscópica; **c)** ovitrampa
Fuente: Elaboración propia.

Relevamiento de condiciones ambientales y colecta de ejemplares

Se realizaron 28 recorridos en los entornos donde se encontraban instaladas las ovitrampas, con el objetivo de relevar las condiciones ambientales y colectar ejemplares mediante distintas técnicas de muestreo. Las ovitrampas se ubicaron tanto en hogares como en establecimientos de salud (CAPS e HIGA San Roque). De este modo, los relevamientos permitieron caracterizar tanto los ambientes domiciliarios donde las mujeres encuestadas desarrollaban las tareas de cuidado no remuneradas como, en algunos casos, los establecimientos de salud que constituían sus espacios de trabajo. Durante los recorridos se registró la existencia de elementos de protección que limitaran el ingreso del mosquito a las instalaciones, la presencia de potenciales y reales sitios de cría, entre otras. Se colectaron individuos adultos mediante redes entomológicas y aspiradores manuales e individuos inmaduros mediante cucharones y pipetas, los cuales fueron trasladados al CEPAVE para su identificación utilizando claves dicotómicas (27).

Condiciones meteorológicas

Se obtuvieron datos diarios de humedad relativa, precipitaciones y temperaturas máximas y mínimas correspondientes al período de estudio. Los datos fueron obtenidos de la estación meteorológica 875930 SADL.

Análisis de datos

Los datos obtenidos fueron sistematizados en bases de datos específicas según su naturaleza (sociocultural y entomológica) para su posterior análisis. Cada conjunto de datos fue analizado mediante las pruebas estadísticas apropiadas según sus características, los objetivos

específicos del estudio y el cumplimiento de los supuestos requeridos para cada análisis. Los análisis se realizaron utilizando el software R (R Core Team) a través de la interfaz RStudio, considerando un nivel de significancia de $\alpha = 0,05$. Para evaluar la asociación entre el género y la realización de tareas de cuidado realizamos un test de chi cuadrado. Para analizar las horas de cuidado (tanto semanales como de fin de semana), según el género, se utilizó un test Wilcoxon. Para evaluar la relación entre pertenecer a un determinado barrio, el género de la persona que cuida y la cantidad de horas de cuidado, tanto los días de semana como los fines de semana, se utilizó un modelo de regresión lineal. De manera exploratoria, se evaluó la asociación entre el promedio de horas destinadas a las tareas de cuidado y el promedio de huevos de *Aedes aegypti* registrados en cada barrio mediante un análisis de correlación de Pearson. Debido al reducido número de unidades de análisis, este procedimiento tuvo un carácter exploratorio y fue realizado con el objetivo de identificar posibles patrones de asociación que orienten futuras investigaciones. Para analizar la relación entre la proporción de trampas positivas y las condiciones climáticas, se utilizó un GLMM (distribución binomial) y selección de modelos basada en el Criterio de Información de Akaike (AIC), eliminando las variables según su p-valor y su aporte al modelo. La relación entre la cantidad de huevos (variable de conteo con sobredispersión) y las variables climáticas, fue analizada a través de un GLMM (distribución binomial negativa) y selección del mejor modelo por AIC. Para el análisis de esta relación, se utilizaron valores promedio semanales de temperatura máxima y mínima, humedad relativa y precipitaciones, correspondientes a cada semana epidemiológica (SE) de muestreo. Estos valores fueron relacionados con el promedio semanal de huevos recolectados en las ovitrampas como medida indirecta de la abundancia del vector.

Apartado ético

Este trabajo obtuvo dictamen favorable del Comité de Ética en Investigación del HIGA San Roque de Gonnet. No se indagó sobre datos que permitieran identificar a las personas participantes. Se resguardó la identidad de las participantes.

Rs
RESULTADOS

Resultado del relevamiento de determinantes sociales

Durante agosto de 2024 y junio de 2025 se realizaron 43 EUT a mujeres adultas pertenecientes a 43 hogares. Dado que las entrevistadas aportaron toda la información requerida en la EUT sobre ellas y sobre quienes integraban los hogares, se obtuvieron datos correspondientes a más de 130 personas tanto mayores como menores de edad. Los hogares pertenecían a distintos barrios del área programática: Gorina, Gonnet, Villa Elisa, City Bell, Ringuelet, Tolosa y Arturo Seguí (Figura 2).




Figura 2. Mapa del área estudiada donde se indican con círculos negros la ubicación de las ovitrampas y con círculos rojos la cuadra a la que pertenece la vivienda encuestada
Fuente: Elaboración propia. Imagen elaborada mediante Google Earth Pro.

Las EUT relevaron información sobre el género de las personas integrantes de los hogares, obteniendo solo datos para personas pertenecientes a los géneros mujer y varón, por lo que los análisis se realizaron considerando únicamente estas dos categorías. De los 43 hogares relevados, en 40 se identificaron tareas de cuidado asumidas por mujeres (madres, hijas o abuelas). Estas tareas incluyeron el cuidado de niños/as, personas mayores o personas con enfermedades, además de las actividades vinculadas al cuidado del hogar. Las encuestas fueron respondidas por 43 mujeres adultas, quienes aportaron información sobre la distribución del tiempo destinado al trabajo reproductivo y productivo de las personas adultas integrantes de sus hogares. De este modo, se obtuvo información correspondiente a 96 personas mayores de 18 años: 51 mujeres y 45 varones (Tabla 1).

Tabla 1. Distribución de las tareas de cuidado según género en personas mayores de 18 años. Personas mayores de 18 años (n = 96; rango de edad = 18 a 91 años)

		MUJERES n = 51 (njƀ 41 ± 13,4 años)	VARONES n = 45 (njƀ 42 ± 17,5 años)
Tareas de cuidado	Realizan	86% n = 44 (njƀ41 ± 13,4 años)	53,3% n = 24 (njƀ 42 ± 17,5 años)
	No realizan	11,7 % n = 6 (njƀ 41±13.8 años)	37,7% n = 17 (njƀ 41 ± 17,6 años)
	Horas en la semana	njƀ 8,18 h/día	njƀ 2,93 h/día
	Horas los fines de semana	njƀ 9,04 h/día	njƀ 4,02 h/día

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados indican que existen diferencias estadísticamente significativas en la realización de tareas de cuidado según el género (χ_2 = 8,85, gl = 1, p < 0,05), siendo mayor la cantidad de mujeres que realizan tareas de cuidado. En cuanto a la cantidad de horas dedicadas al cuidado (Tabla 1), se obtuvo que existen diferencias estadísticamente significativas dependiendo del género: tanto en los días de semana como en los del fin de semana las mujeres dedican mayor cantidad de horas a las tareas de cuidado que los varones (Días de semana: w = 1527, p < 0,05; Fines de semana: w = 1474, p < 0,05).

Con relación a la posible asociación entre pertenecer a un determinado barrio, el género de la persona que cuida y la cantidad de horas de cuidado durante la semana y los fines de semana, los resultados indican que existe un patrón general que se repite en todos los barrios que es que las mujeres cuidan más cantidad de horas que los varones. Esta diferencia en horas varía entre los barrios: en City Bell, Gorina y Gonnet, los varones realizan tareas de cuidado aproximadamente 2 horas menos que las mujeres, en Ringuelet y Villa Elisa los varones dedican 4 horas menos que las mujeres, en Tolosa los varones cuidan casi 6 horas menos que las mujeres y en Arturo Seguí se observa que los varones cuidan 13,5 horas menos (Tabla 2). Analizando la relación entre pertenecer a un determinado barrio, el género de la persona que cuida y la cantidad de horas de cuidado los fines de semana, se obtuvo que, en City Bell, la diferencia es casi nula (0,2 horas), en Gorina la diferencia es de 2 horas, en Gonnet es de 3 horas, en Tolosa y Villa Elisa los varones cuidan 4 horas menos que las mujeres, en Ringuelet la diferencia aumenta a 6 horas y en Arturo Seguí hay una gran diferencia de 12 horas.

Salud Publica 2026 Oct; 5

Tabla 2. Diferencia de horas de tareas de cuidado los días de semana y los fines de semana por barrio y por género (resultados del Modelo de Regresión Lineal)

	BARRIO	ESTIMATE GÉNERO	ESTIMATE BARRIO: GÉNERO	DIFERENCIA DE ESTIMATE	P VALUE
Días de semana	City Bell	-13,47	11,73	-1,74	0,0038
	Gonnet	-13,47	11,40	-2,07	0,0033
	Gorina	-13,47	11,81	-1,66	0,0014
	Ringuelet	-13,47	9,64	-3,8	0,014
	Tolosa	-13,47	7,48	-5,99	0,24
	Villa Elisa	-13,47	9,76	-3,71	0,0013
Días de fines de semana	City Bell	-12,2	12,4	0,2	0,023
	Gonnet	-12,2	9,13	-3,07	0,078
	Gorina	-12,2	10,53	-1,67	0,034
	Ringuelet	-12,2	6,53	-5,67	0,21
	Tolosa	-12,2	8,20	-4,00	0,34
	Villa Elisa	-12,2	8,72	-3,48	0,031

Fuente: Elaboración propia.

En el marco de un análisis exploratorio, se observó una correlación positiva entre el promedio de horas dedicadas a las tareas de cuidado y el promedio de huevos de *Aedes aegypti* registrados por barrio ($r = 0,82$; $p < 0,05$, IC 95% 0.02-0,98, df = 4). Debido al reducido número de barrios incluidos en este análisis se presenta como una aproximación inicial que merece ser evaluada en estudios con mayor representatividad territorial.

Analizando los datos recolectados con relación al trabajo remunerado, se encontró que, de las 95 personas mayores de 18 años de ambos géneros, el 75% (n = 71) poseía trabajo remunerado, el 10,5% (n = 10) no tenía trabajo remunerado y el 14,5% (n = 14) prefirió no responder este punto. De las 72 personas con trabajo remunerado, el 58% (n = 42) eran mujeres y dedicaban en promedio 7,36 DS ± 2,6 h diarias. El 42% (n = 30) restante eran hombres y dedicaban en

promedio 7,35 ± 2,63 h diarias. De las 42 mujeres que declararon tener trabajo remunerado, el 90% (n = 38) también declaró realizar tareas de cuidado, mientras que, de los 30 varones con trabajo remunerado, el 73% realizaba tareas de cuidado (n = 22). Analizando los espacios más frecuentes en los que los varones realizan trabajos remunerados, se obtuvo que las mayores frecuencias eran oficinas (n = 6), domicilios (n = 6) y obras de construcción (n = 4). Por otro lado, las mujeres presentaron como lugar de trabajo más frecuentes espacios dedicados a la atención de la salud (n = 20) y en segundo lugar domicilios particulares (n = 9). Cabe destacar que en estos espacios las mujeres realizan trabajos relacionados a tareas de cuidado como promoción de la salud, limpieza, cuidadores de niñeces, etc., por los cuales debían permanecer varias horas en dichos espacios realizando sus actividades.

Según la información brindada por las mujeres encuestadas, más del 70% de las personas que tenían antecedentes de dengue eran mujeres que desarrollaban tareas de cuidado, tanto en el ámbito doméstico como en actividades laborales vinculadas al cuidado (promotoras de salud, niñeras y trabajadoras de casas particulares).

En relación con las condiciones de las viviendas de las personas encuestadas, la mayoría de los hogares cuenta con agua de red (86%) y de aquellas viviendas que no poseen agua de red se obtuvo que realizan recolección de agua de pozo, cisterna con tapa y bomba. También se identificó que en algunos hogares se recolecta agua de lluvia para el regado de plantas y que esta recolección se realiza en elementos que podrían representar potenciales criaderos de mosquitos. El 94% de las personas encuestadas refieren contar con servicio de recolección de residuos en su domicilio, de los cuales el 84% está conforme con el funcionamiento del servicio.

RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO ENTOMOLÓGICO Y REGISTROS CLIMÁTICOS

Se instalaron un total de 20 ovitrampas, distribuidas entre hogares y establecimientos de salud (CAPS e HIGA San Roque) del área de estudio, las cuales permanecieron activas durante las semanas epidemiológicas (SE) 35-52 de 2024 y 1-22 de 2025 (Figura 2). La cantidad de trampas por barrios fue: Arturo Seguí (n = 1), City Bell (n = 3), Gonnet (n = 7), José Hernández (n = 1), Ringuelet (n = 2), Tolosa (n = 4), Villa Elisa (n = 2).

En cuanto a la relación entre la positividad de la trampa y las condiciones meteorológicas, se obtuvieron que los modelos que explican esta relación contienen a la temperatura máxima y la humedad relativa (AIC = 103.63, p = 0,033) y a la temperatura máxima y la precipitación (AIC = 104.18, p = 0,045). El análisis de la relación entre la cantidad de huevos y las variables climáticas indicó que el modelo final que incluye las variables temperatura máxima y precipitación (Temp Max: $p < 0.05$, Estimate = 0,17, SD = 0,03, Precip: $p < 0,05$, Estimate = 0,31, SD = 0,09) muestra un mejor desempeño que el modelo nulo ($\chi_2 = 16,74$, df = 2, $p < 0,05$) (Figura 3).




Figura 3. Número de huevos de *Aedes aegypti*, precipitación (mm) y temperaturas máxima y mínima (°C) según semana epidemiológica durante el período 2024-2025
Fuente: Elaboración propia.

Caracterización habitacional y ambiental

Durante los recorridos por el interior y exterior de las instalaciones donde se colocaron ovitrampas, se detectó que, en cuanto a elementos de prevención, la mayoría de los sitios no poseían tela mosquitera en puerta y ventanas, presentaban ventiladores y aires acondicionados (no en todos los espacios) y disponían de repelentes comerciales. En relación con los elementos de control de cría/presencia de *Ae. Aegypti*, se observó que la mayoría de los sitios recorridos no poseían tela mosquitera en las rejillas y se encontró, tanto dentro como fuera, mucha diversidad de criaderos, la mayoría de ellos eran tachos plásticos para la recolección del agua de los aires acondicionados, botellas, envases y otros recipientes plásticos en desuso. Además, se observaron canaletas sucias que acumulaban agua, baldes con agua, pozos de agua sin tapa o con la tapa rota. Se recolectaron larvas de *Ae. aegypti* en varios de los recipientes encontrados y se colectaron individuos adultos de *Ae. aegypti, Culex sp, y Ae. albifasciatus* durante los recorridos por el interior y el exterior de las instalaciones.

Ds
DISCUSIÓN

En Argentina es creciente la preocupación por la situación en relación con el dengue, enfermedad que avanza a nivel mundial y que está relacionada y condicionada por una gran variedad de factores, lo que obliga a integrar perspectivas sociales, económicas y ecológicas a la hora de abordar la problemática (3, 12, 28).

Este proyecto analiza la relación entre distintos factores sociales, entomológicos y ambientales que interactúan modelando la dinámica del dengue en el área programática del HIGA San Roque de Gonnet. Especialmente, indagó cómo las diferencias por razones de género, que determinan la división sexual del trabajo, predisponen a las mujeres a una mayor exposición al contagio de la enfermedad, considerando la distribución desigual de las tareas de cuidado (3). En tal sentido, se realizó un trabajo interdisciplinario e integrador a través del uso de diferentes metodologías, con relevamiento de datos para caracterizar la exposición al contagio de dengue.

La división sexual del trabajo es considerada una forma básica de segregación social, mediante la que las mujeres son relegadas mayoritariamente al trabajo reproductivo doméstico no remunerado, generando diversas desventajas, provocando, entre otras cosas, una sobrecarga laboral no visibilizada socialmente (8-9, 29). Dentro del trabajo reproductivo, se incluyen acciones relacionadas al cuidado, gestión, relación, mantenimiento etc., todas principalmente desarrolladas en el ámbito privado (7, 30). Para analizar los resultados y hallazgos obtenidos es importante definir los términos “cuidado” y “tareas de cuidado”, relacionados con acciones que garantizan el bienestar cotidiano de las personas y que satisfacen las necesidades básicas (alimentación, higiene, atención a la salud, compañía), tanto de personas dependientes (por edad o por condiciones físicas o mentales) como de aquellas que podrían autocuidarse (7, 30). El cuidado es una dimensión política central de la vida social, aunque históricamente invisibilizada. Según señala Tronto (31), una sociedad justa es aquella en la que todos reciben y ofrecen cuidado de forma equitativa, y nadie queda sistemáticamente excluido de esta red. También se ha abordado cómo el trabajo doméstico y de cuidados ha sido expropiado y no remunerado dentro del sistema capitalista, recayendo principalmente sobre las mujeres (7, 30, 32). Esta desigualdad se expresa tanto en la organización de los hogares como en el acceso a servicios públicos y en la exposición diferencial a riesgos sanitarios.
Los resultados de esta investigación sugieren que existe una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al porcentaje de mujeres que realizan tareas de cuidado con relación a los varones y a la cantidad de horas que ellas dedican a dichas tareas. Esta diferencia se sostiene también cuando se considera sólo a aquellas personas que tienen trabajos remunerados, es decir, aun cuando varones y mujeres tienen trabajos remunerados, las mujeres siguen siendo quienes realizan más tareas de cuidado. Cabe mencionar que las tareas que en su mayoría declararon realizar las mujeres corresponden a promoción de la salud, limpieza y cuidado del hogar, cuidado de infancias, cuidado de adultos/as mayores, etc. Por otro lado, se identificó este patrón en el reparto de tareas de cuidado aun los fines de semana, lo que podría indicar que, por lo general, cuando tanto mujeres como varones disponen de mayor cantidad de tiempo libre, igualmente recae en las mujeres el cuidado. Estos resultados concuerdan con los encontrados en el resto del país, así como también otras partes del mundo, y se repiten a lo largo de los años. La existencia de este patrón es reconocida desde décadas atrás (7, 33). De hecho, la economía del cuidado analiza y discute, desde una mirada histórica, la segregación sexual del trabajo y su impacto en la economía (7). Que las mujeres continúen concentrando las tareas de cuidado, incluso cuando participan activamente en el mercado laboral, demuestra que las políticas de inserción laboral son insuficientes si no se acompañan de medidas que promuevan la corresponsabilidad en el cuidado y el desarrollo de servicios públicos adecuados (33).

Aunque el análisis exploratorio de la relación entre cantidad de huevos y cantidad de horas dedicada a las tareas de cuidado mostró una asociación positiva, el reducido número de barrios analizados impide extraer conclusiones firmes. No obstante, este hallazgo constituye una hipótesis

de trabajo relevante y sugiere la necesidad de desarrollar estudios específicamente diseñados para evaluar la relación entre la división sexual del trabajo reproductivo y la presencia del vector a una escala territorial más amplia.
Por otro lado, se caracterizaron los espacios donde las mujeres realizan tareas de cuidado (incluidas o no en sus actividades laborales remuneradas), considerando que estos ámbitos forman parte de los contextos cotidianos donde pueden configurarse condiciones diferenciales de exposición al *Aedes aegypti*. Según los resultados, las mujeres desarrollan sus actividades principalmente en instituciones de salud y domicilios, mientras que los varones lo hacen principalmente en oficinas, domicilios y construcciones. Esta diferencia en los espacios ocupados para el desarrollo de trabajos remunerados se observa en nuestro país desde hace varios años (7). Este panorama situado en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, también es reflejo de lo que sucede a nivel nacional y reafirma que, aunque se pueda percibir un aumento de la participación de las mujeres en el ámbito laboral formal (33), se siguen reproduciendo la concentración del trabajo feminizado en ámbitos que incluyen de alguna manera el cuidado (7) y que, según este estudio, se desarrollan en ambientes óptimos para la existencia del vector del dengue. Asimismo, se colectaron ejemplares de *Ae. aegypti* en distintos estados de desarrollo y se identificaron potenciales y reales sitios de cría en los sitios evaluados dentro del área de estudio. Esta información, fue integrada con la caracterización de los espacios donde las mujeres desarrollan tareas de cuidado y actividades laborales remuneradas, a fin de contextualizar las condiciones de exposición al vector.

Para incorporar una dimensión territorial al análisis de la distribución del trabajo reproductivo, se consideró la variable "barrio" como contexto de residencia de las personas encuestadas. En todos los barrios relevados las tareas de cuidado fueron realizadas principalmente por mujeres, no obstante, se identificaron diferencias entre barrios en la cantidad de horas destinadas a estas actividades, con brechas de hasta 13 horas menos dedicadas por los varones respecto de las mujeres. Estas variaciones territoriales podrían estar asociadas a características sociales y culturales propias de cada contexto barrial que influyen en la organización del trabajo reproductivo (7); sin embargo, requieren estudios específicos para su evaluación.

La caracterización de las condiciones de exposición al dengue requiere considerar, además de las dimensiones sociales y territoriales previamente descritas, los factores ambientales que condicionan la dinámica poblacional del mosquito vector. En este sentido, los resultados evidenciaron que la presencia y abundancia de *Aedes aegypti* (estimada indirectamente mediante el número de huevos) presentó variaciones asociadas a variables climáticas como la temperatura máxima y las precipitaciones. La temperatura constituye un factor relevante en la biología del vector, ya que influye sobre diferentes etapas de su ciclo de vida (11-12, 20,34). Por su parte, las precipitaciones favorecen la disponibilidad de recipientes con acumulación de agua, generando condiciones propicias para la oviposición y el desarrollo de los estadios inmaduros del mosquito (12, 35). En este contexto, las condiciones climáticas actúan como moduladores del ambiente donde se desarrolla el *Aedes aegypti*, contribuyendo a configurar escenarios diferenciales de exposición al vector.

Este estudio contribuye a visibilizar cómo las desigualdades de género pueden intervenir en la configuración de condiciones diferenciales de exposición a enfermedades transmitidas por vectores, al situar la división sexual del trabajo reproductivo como una dimensión relevante para el análisis epidemiológico del dengue. Incorporar la perspectiva de género en la prevención del dengue, implica considerar cómo las responsabilidades de cuidado y las condiciones socioeconómicas diferenciadas configuran condiciones de exposición diferenciales frente al dengue. Esto requiere reconocer y actuar sobre los determinantes sociales de la salud, incluyendo la división sexual del trabajo, la precariedad habitacional, las brechas de acceso a servicios y la sobrecarga de tareas de cuidado. Se vuelve fundamental avanzar en políticas públicas que reconozcan el trabajo de cuidados como un factor de riesgo diferencial en materia sanitaria, especialmente en el diseño de estrategias preventivas frente a enfermedades transmitidas por vectores como el dengue. Incluir esta perspectiva supone desarrollar políticas integradas que aborden de manera conjunta las dimensiones de salud, género y cuidados, promoviendo la articulación entre distintas áreas del Estado, como salud, desarrollo social y políticas de género.

En contextos de crisis sanitaria, como el dengue, las mujeres suelen asumir tareas adicionales de cuidado, limpieza, prevención y acompañamiento (36). Este rol que cumplen las mujeres podría provocar una exposición mayor aún al vector. Resulta clave fortalecer el rol de las promotoras de salud y de las redes comunitarias que hoy funcionan como sostén territorial, garantizando para ellas condiciones laborales dignas, estabilidad y formación con perspectiva de género. Del mismo modo, es importante ampliar el acceso equitativo a elementos de protección —como repelentes, mosquiteros, jornadas de capacitación o tareas de desinfección ambiental—, priorizando especialmente a los hogares a cargo de mujeres cuidadoras.

Asimismo, se requiere una revisión crítica de la planificación territorial y de las intervenciones barriales, con el objetivo de priorizar aquellas zonas donde los indicadores de riesgo sanitario se superponen con condiciones de precariedad habitacional y desigualdad de género, lo que configura escenarios de alta vulnerabilidad.
Una limitación del presente estudio se relaciona con el tamaño muestral y su distribución territorial. Si bien el muestreo intencional permitió relevar información valiosa sobre la división del trabajo reproductivo y las condiciones

de exposición en los hogares incluidos, el reducido número de encuestas por barrio limita la posibilidad de realizar inferencias estadísticas a escala local. Por ello, las diferencias observadas entre territorios deben interpretarse con cautela. No obstante, los resultados permiten identificar tendencias generales y aportan evidencia sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género en el análisis de las condiciones de exposición al dengue. Asimismo, las variables climáticas se analizaron utilizando los valores correspondientes a la misma semana epidemiológica en la que se registró la abundancia de huevos, sin considerar posibles efectos de rezago. Dado que el objetivo de este componente fue caracterizar el contexto ambiental del período de estudio, más que desarrollar un modelo predictivo, futuros trabajos podrían incorporar variables climáticas con desfases temporales para evaluar con mayor precisión la influencia de las condiciones ambientales sobre la oviposición del vector.

A pesar de estas limitaciones, los resultados obtenidos abren nuevas líneas de investigación para profundizar la comprensión de las condiciones sociales que configuran la exposición al dengue. En este sentido, sería interesante incorporar un enfoque interseccional que considere dimensiones como la etnia, la edad, la discapacidad o la situación migratoria, así como desarrollar estudios cualitativos que recuperen las experiencias de las mujeres en relación con las tareas de cuidado, la prevención y la gestión cotidiana del dengue. Asimismo, futuros trabajos podrían explorar el impacto físico y emocional de la doble jornada laboral durante brotes epidémicos y evaluar experiencias comunitarias con perspectiva de género implementadas en otros contextos. Incorporar esta mirada no solo permite comprender con mayor profundidad las dinámicas del contagio, sino también transformar las formas de intervención estatal, hacia una salud pública más equitativa, inclusiva y sensible a las condiciones reales de vida de quienes, cada día, sostienen la reproducción de la vida.

Cn

CONCLUSIONES

Esta investigación evidencia que el riesgo de contagio de dengue no se distribuye de manera homogénea en la población, sino que se encuentra modelado por una variedad de factores que interactúan simultáneamente. La integración de las variables sociales, ambientales y entomológicas en el área programática del Hospital Interzonal General de Agudos San Roque de Gonnet, permitió demostrar que la división sexual del trabajo constituye un determinante relevante de la exposición diferencial al vector.

A partir de los resultados, se concluye que las mujeres concentran de manera diferencial las tareas de cuidado, tanto remuneradas como no remuneradas, y destinan mayor cantidad de tiempo a estas actividades, incluso cuando participan del mercado laboral formal. Estas tareas se desarrollan principalmente en ambientes domiciliarios y otros espacios cotidianos que, de acuerdo con el relevamiento entomológico realizado, constituyen contextos donde se registró la presencia de *Aedes aegypti* y condiciones compatibles con su desarrollo. En este sentido, los resultados resaltan la importancia de incorporar la división sexual del trabajo reproductivo como una dimensión social relevante, al configurar diferencias en los tiempos, espacios y dinámicas cotidianas en los que mujeres y varones desarrollan sus actividades.

Por eso, es necesario incorporar estrategias de prevención y control con perspectiva de género, reconociendo la organización social del cuidado como un componente relevante para el abordaje integral de las enfermedades transmitidas por vectores. A partir de estos hallazgos, se vuelve fundamental promover acciones integradas que contemplen la corresponsabilidad del cuidado, el fortalecimiento de servicios públicos, la mejora de las condiciones laborales de trabajadoras comunitarias y de salud y la provisión equitativa de medidas de protección y saneamiento ambiental, priorizando territorios con mayores niveles de vulnerabilidad.

Finalmente, este estudio destaca la importancia de continuar desarrollando abordajes interdisciplinarios e interseccionales que permitan comprender con mayor profundidad los diversos factores sociales, económicos y ambientales que interactúan en la configuración del riesgo sanitario. Incorporar estas dimensiones en la planificación de las estrategias de prevención y control de enfermedades, resulta clave para avanzar hacia intervenciones de salud pública más equitativas, efectivas y sensibles a las condiciones reales de vida de la población.

AGRADECIMIENTOS

A todas las personas involucradas en este proyecto, principalmente a todas las mujeres que participaron tanto respondiendo la encuesta como permitiéndonos tomar las muestras entomológicas. MVB agradece a su hijo LCB por su comprensión y apoyo, que hicieron posible compatibilizar la maternidad y la investigación. Al personal del CEPAVE y del HIGA San Roque de Gonnet que facilitaron la realización de este proyecto.

Autoras no manifiestan conflictos de interés.

RB

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Breilh J. Latin American critical ('Social') epidemiology: new settings for an old dream. Int J Epidemiol [Internet]. 2008 [Acceso ago. 2026];37(4):745-50. Disponible en: https://doi.org/ 10.1093/ije/dyn135
2. Waitzkin H, Iriart C, Estrada A, Lamadrid S. Social medicine then and now: lessons from Latin America. Am J Public Health. [Internet]. 2001 [Acceso ago. 2026];91(10):1592-601. Disponible en: https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.91.10.1592
3. Arenas-Monreal L, Piña-Pozas M, Gómez-Dantés H. Aportes y desafíos del enfoque de género en el estudio de las enfermedades transmitidas por vector. Salud Publica Mex [Internet]. 2015 [Acceso ago. 2026];57:66-75. Disponible en: https://doi.org/ doi:10.21149/spm.v57i1.7404
4. Rubin-Kurtzman JR, Denman Champion CA. Género, salud y ambiente en América Latina: una propuesta de análisis y su pertinencia para la Red [Internet]. Los Ángeles (CA): California Center for Population Research; 2006 [Acceso ago. 2026]. Disponible en: https://ccpr.ucla.edu/wp-content/uploads/2024/04/Genero_-Salud-y-Ambiente-en-America-Latina_-Una-Propuesta-de-Analisis-y-su-Pertinencia-para-la-Red.pdf
5. Wenham C, Nunes J, Correa Matta G, de Oliveira Nogueira C, Aparecida Valente P, Pimenta DN. Gender mainstreaming as a pathway for sustainable arbovirus control in Latin America. PLoS Negl Trop Dis [Internet]. 2020 [Acceso ago. 2026];14(2):e0007954. Disponible en: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0007954
6. Crenshaw K. Demarginalizing the intersection of race and sex: a Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. Univ Chic Leg Forum [Internet]. 1989 [Acceso ago. 2026];1989(1):139-67. Disponible en: http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8
7. Rodríguez Enríquez C. Trabajo de cuidados y trabajo asalariado: desarmando nudos de reproducción de desigualdad. Theomai [Internet]. 2019 [Acceso ago. 2026];(39):78-99. Disponible en: https://www.redalyc.org/journal/124/12466126006/12466126006.pdf
8. Vargas V. Cuidados, asistencia y discapacidad en América Latina: percepciones desde la sociedad civil y avances legislativos [Internet]. Buenos Aires: Equipo Latinoamericano de Justicia y Género; 2020 [Acceso ago. 2026]. Disponible en: https://ela.org.ar/wp-content/uploads/2023/06/2020-Cuidados-asistencia-y-discapacidad-en-America-Latina.pdf
9. Rodríguez Enríquez C, Marzonetto G, Alonso V. Organización social del cuidado en la Argentina: brechas persistentes e impacto de las recientes reformas económicas. Estudios del Trabajo [Internet]. 2019 [Acceso ago. 2026];(58):2-31. Disponible en: https://ojs.aset.org.ar/revista/article/view/53
10. Arévalo C, Paz J. Desigualdad entre géneros en el uso del tiempo total de trabajo (remunerado y no remunerado): una exploración para la Ciudad de Buenos Aires. Lavboratorio [Internet]. 2015 [Acceso ago. 2026];(26):81-105. Disponible en: https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/lavboratorio/article/view/1297
11. Matysiak A, Roess A. Interrelationship between climatic, ecologic, social, and cultural determinants affecting dengue emergence and transmission in Puerto Rico and their implications for Zika response. J Trop Med [Internet]. 2017 [Acceso ago. 2026];2017:8947067. Disponible en: https://doi.org/10.1155/2017/8947067
12. Barkhad A, Lecours N, Stevens-Uninsky M, Mbuagbaw L. The ecological, biological, and social determinants of dengue epidemiology in Latin America and the Caribbean: a scoping review of the literature. Eco Health [Internet]. 2025 [Acceso ago. 2026];22:203-21. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007/s10393-025-01706-0
13. Vanlerberghe V, Verdonck K. La inequidad en salud: el caso del dengue. Rev Perú Med Exp Salud Publica [Internet]. 2013 [Acceso ago. 2026];30(4):683-6. Disponible en: https://doi.org/10.17843/rpmesp.2013.304.252
14. Weaver SC. Prediction and prevention of urban arbovirus epidemics: a challenge for the global virology community. Antiviral Res [Internet]. 2018 [Acceso ago. 2026];156:80-4. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2018.06.009
15. Harrington LC, Edman JD, Scott TW. Why do female *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae) feed preferentially and frequently on human blood? J Med Entomol [Internet]. 2001 [Acceso ago. 2026];38(3):411-22. Disponible en: https://doi.org/10.1603/0022-2585-38.3.411
16. Consoli RAGB, Oliveira RL. Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil [Internet]. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 1994 [Acceso ago. 2026]. Disponible en: https://doi.org/10.7476/9788575412909
17. Dzul-Manzanilla F, Ibarra-López J, Bibiano Marín W, Martini-Jaimes A, Leyva JT, Correa-Morales F et al. Indoor resting behavior of *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae) in Acapulco, México. J Med Entomol [Internet]. 2017 [Acceso ago. 2026]; 54(2):501-4.Disponible en: https://doi.org/10.1093/jme/tjw203
18. Harrington LC, Ponlawat A, Edman JD, Scott TW, Vermeylen F. Influence of container size, location, and time of day on oviposition patterns of the dengue vector, *Aedes aegypti*, in Thailand. Vector Borne Zoonotic Dis [Internet]. 2008 [Acceso ago. 2026];8(3):415-24. Disponible en: https://doi.org/10.1089/vbz.2007.0203
19. Abreu FVS, Morais MM, Ribeiro SP, Eiras AE. Influence of breeding site availability on the oviposition behaviour of *Aedes aegypti*. Mem Inst Oswaldo Cruz [Internet]. 2015 [Acceso ago. 2026];110:669-76. Disponible en: https://doi.org/10.1590/0074-02760140490
20. Micieli MV, García JJ, Achinelly MF, Martí GA. Dinámica poblacional de los estadios inmaduros del vector del dengue *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae): un estudio longitudinal (1996-2000). Rev Biol Trop [Internet]. 2006 [Acceso ago. 2026];54(3):979-83. Disponible en: https://doi.org/doi:10.15517/rbt.v54i3.14077
21. Buenos Aires. Ministerio de Salud. Dirección Provincial de Epidemiología, Prevención y Promoción de la Salud. Boletín epidemiológico 13 [Internet]. La Plata: Ministerio de Salud; 2024 [Acceso ago. 2026]. Disponible en: https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/media/files/2024/04/Bolet%C3%ADn-epidemiol%C3%B3gico_13.pdf
22. Legarreta Iza ML. El tiempo donado en el ámbito doméstico: reflexiones para el análisis del trabajo doméstico y los cuidados. Cuad Relac Lab [Internet]. 2008 [Acceso ago. 2026];26(2):46-69.Disponible en: https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/CRLA0808220045A
23. Araya MJ. Un acercamiento a las encuestas sobre el uso del tiempo con orientación de género [Internet]. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Unidad Mujer y Desarrollo; 2003 [Acceso ago. 2026]. Disponible en: https://digitallibrary.un.org/record/511394?ln=es&v=pdf
24. Esquivel V, Budlender D, Folbre N, Hirway I. Explorations: time-use surveys in the south. Fem Econ [Internet]. 2008 [Acceso ago. 2026];14(3):107-52. Disponible en: https://doi.org/doi:10.1080/13545700802075135
25. Aguirre R, Ferrari F. Las encuestas sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado en América Latina y el Caribe: caminos recorridos y desafíos hacia el futuro [Internet]. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe; 2014 [Acceso ago. 2026]. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/c016720a-f1f7-496e-a06d-722b646111fd/content
26. Chanampa M, Gil JF, Aparicio JP, Castillo P, Mangudo C, Copa GN et al. Field comparison of oviposition substrates used in ovitraps for *Aedes aegypti* surveillance in Salta, Argentina. J Appl Entomol [Internet]. 2018 [Acceso ago. 2026];142(10):985-90. Disponible en: https://doi.org/10.1111/jen.12554
27. Darsie RF, Mitchell CJ. Mosquitoes of Argentina. Part I. Keys for identification of adult females and fourth stage larvae in English and Spanish (Diptera: Culicidae). Mosq Syst. 1985; 17: 163-334.

28. Mulligan K, Dixon J, Sinn CLJ, Elliott SJ. Is dengue a disease of poverty? A systematic review. Pathog Glob Health [Internet]. 2015 [Acceso ago. 2026];109(1):10-18. Disponible en: https://doi.org/10.1179/2047773214Y.0000000168
29. De Oliveira O, Ariza M. Género, trabajo y exclusión social en México. Estud Demogr Urbanos [Internet]. 2000 [Acceso ago. 2026];15(1):11-33. Disponible en: https://doi.org/10.24201/edu.v15i1.1065
30. Larrañaga I, Arregui B, Arpal J. El trabajo reproductivo o doméstico. Gac Sanit [Internet]. 2004 [Acceso ago. 2026]; 18(4):31-7. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112004000400007
31. Tronto JC. Moral boundaries: a political argument for an ethic of care. New York: Routledge; 1993.
32. Federici S. El patriarcado del salario: críticas feministas al marxismo [Internet]. Madrid: Traficantes de Sueños; 2018 [Acceso ago. 2026]. Disponible en: https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/TDS_map49_federici_web_0.pdf
33. Lupica K. Trabajo decente y corresponsabilidad de los cuidados en Argentina [Internet]. Santiago de Chile: Organización Internacional del Trabajo; 2010 [Acceso ago. 2026]. Disponible en: https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/td_corresponsa.pdf
34. López MS, Gómez AA, Müller GV, Walker E, Robert MA, Estallo EL. Relationship between climate variables and dengue incidence in Argentina. Environ Health Perspect [Internet]. 2023 [Acceso ago. 2026];131(5):057008. Disponible en: https://doi.org/10.1289/EHP11616
35. World Health Organization. Regional Office for South-East Asia. Comprehensive guidelines for prevention and control of dengue and dengue haemorrhagic fever [Internet]. New Delhi: WHO Regional Office for South-East Asia; 2011 [Acceso ago. 2026]. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204894/1/B4751.pdf
36. Segato RL. Las estructuras elementales de la violencia: ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos. Buenos Aires: Prometeo; 2014.

Esta obra está bajo una licencia Attribution 4.0 International Creative Commons

Cómo citar este artículo:
Brividoro M, Cano ME, Micieli MV, Tack L, Lasarte ME. Las tareas de cuidado y la exposición diferencial al dengue desde una perspectiva de género: un estudio en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina (2024–2025). Salud Publica [Internet]. 2026 Oct [fecha de consulta]; 5. Disponible en: URL del artículo.